



Door Monique Carton  
Dierenkliniek 't Spoor

# Dier & gezondheid

## Een veelvoorkomend probleem: verstopte en ontstoken anaalklieren bij de hond

### Wat is een anaalklier?

Anaalklieren zijn zakjes die links en rechts onder in de sluitspier van de anus liggen. Via smalle buisjes legen ze zich in de anus. De inhoud van de zakjes is sterk ruikende bruin/geel/grijze vloeistof of pasta. Als de hond poept knijpt hij de sluitspier samen en daardoor worden de anaalklieren leeg gedrukt. Bij de voorouders van onze honden werd de geur die zo met de ontlasting vrijkwam, gebruikt om het territorium af te bakenen. In geval van paniek worden de anaalklieren ook gelegeerd en sommige honden kunnen ze zelf legen als ze voelen dat ze vol zijn.

### Overvolle anaalklieren

Indien de anaalklieren niet automatisch gelegeerd worden bij elke ontlasting raken ze overvuld. Niet legen kan als de hond zachte ontlasting of diarree heeft en daardoor met te weinig druk de sluitspier samen knijpt of als ze geen tijd nemen om te poepen. Ook zijn er honden waarbij de anaalklieren anatomisch wat onhandig zijn geplaatst en daardoor kan de sluitspier ze niet goed leegdrukken. Als de anaalklieren niet regelmatig worden gelegeerd kan de vloeistof die in de smalle uitgangen staat, indrogen en ontstaat er een soort 'kurkje' op de zakjes en kunnen de anaalklieren helemaal niet meer worden gelegeerd. Door de toegenomen druk die de overvolle anaalklieren op de anus geven, heeft de hond een continu gevoel van aandrang en hij zal dan gaan 'sleetje rijden'.

### Ontstoken anaalklieren

Als de anaalzakjes verstopt zitten kunnen ze gaan ontsteken. De inhoud kiest dan de 'weg van de minste weerstand' naar buiten en soms is dat door de huid heen. Er is eerst een bult onder de anus zichtbaar en daarna een wond waardoor pus en anaalklierinhoud naar buiten komen.

### De behandeling

Met rectale palpatie kunnen we meteen voelen of een anaalklier overvuld/verstopt of ontstoken is. Maar een geoefende kijker kan het ook aan de buitenkant zien of voelen. Bij alleen een overvolle anaalklier is het voldoende om het 'kurkje' van ingedroogde vloeistof uit de kanaaltjes te masseren en daarna de vloeistof uit de zakjes te drukken. Bij sommige honden moet dit regelmatig gebeuren, maar we adviseren om dit alleen te doen als het nodig is. Standaard of te frequent uitknijpen kan tot overproductie van nieuwe anaalkliervloeistof leiden en ook zwelling of schade aan de anaalklierwand geven. Bovendien kan een rustige anaalklier er ook door geïrriteerd raken en juist voor problemen gaan zorgen. Bij een anaalklierontsteking zijn, behalve het leeg halen van de klier, ook antibiotica nodig. Antibiotica komen heel slecht in de anaalklier terecht en daarom is er een lange kuur nodig. Halverwege de kuur knijpen we nog eenmaal de pus die aan het begin van de antibioticakuur is gevormd

**Nu met 25% korting!**

# Nu 25% korting op alle Sigma S2U Nova Producten

\*deze korting is geldig t/m 2 maart 2018

verf- en behangspeciaalzaak  
**Marco van den Berg**

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk • Tel.: 013 - 528 21 62  
[www.marcovandenbergh.nl](http://www.marcovandenbergh.nl)

Sigma S2U Nova. De keiharde lak voor binnen.

Beit ook in Traplak met anti-slip

SIGMA S2U Nova LTA+ Technolac

uit de klier, zodat het laatste deel van de antibioticakuur optimaler kan werken. Soms is een antibioticakuur niet voldoende en moeten we de anaalklieren spoelen. Met een dunne, stompe naald spoelen we de anaalklieren met een reinigende vloeistof schoon en na het spoelen laten we een antibioticazalf in de anaalklier achter. Niet alle honden laten dit zomaar toe en daarom moet dat vaak onder narcose gebeuren.

#### **Voorkomen is beter dan genezen**

Als honden een keer diarree hebben gehad en daardoor overvulde anaalklieren, hoeft het probleem niet meer terug te komen. Maar als honden vaak last hebben van overvulde anaalklieren (dus eigenlijk het niet goed legen van de anaalklieren tijdens het poepen) adviseren we om een voeding te gaan geven met veel vezels. Daardoor wordt de ontlasting steviger, moet de sluitspier harder knijpen bij het poepen en worden de anaalklieren beter geleegd.

Bij honden waar de anaalklieren anatomisch niet zo handig liggen wil het weleens gebeuren dat we ze preventief regelmatig moeten legen, maar zoals gezegd proberen we dat zo minimaal mogelijk te doen. In het uiterste geval is het nodig om de anaalklieren operatief te laten verwijderen. Dan is de hond definitief van zijn anaalklierproblemen af. Maar deze operatie is niet zonder risico's. De anaalklieren liggen in de sluitspier en dus kan door de operatie de sluitspier beschadigen met fecesincontinentie (het niet meer op kunnen houden van de ontlasting) tot gevolg. Deze operatie adviseren we dus alleen als het echt niet anders kan.

## **Februari is de landelijke maand van het gebit**

**Daarom Gratis gebitscontroles tijdens de inlooppreekuren en**

**10% KORTING op gebitsbehandelingen en gebitsproducten**

#### **Inlooppreekuren**

- Maandag t/m vrijdag 9:00 uur tot 10:00 uur en 18:00 uur tot 19:00 uur
- Woensdag (extra spreekuur) 13:30 tot 14:30 uur

#### **Op afspraak**

- Maandag t/m vrijdag 9:00 tot 19:30 uur
- Zaterdag 10:00 uur tot 12:00 uur

Boxtelsebaan 15, Oisterwijk

**013 - 590 22 28**

info@dierenkliniektspoor.nl

**www.dierenkliniektspoor.nl**

Volg dierenkliniekSpoor op 



## **Nergens goedkoper!**

- Houten vloeren
- Laminaat vloeren
- Vloer- en wandtegels
- Natuursteen

**Bezoek onze uitgebreide showroom.**

Leemskuilen 44 - Westerhoven

Tel. +31(0)40 203 05 00

info@escovloeren.nl - www.escovloeren.nl

