



Door Monique Carton
Dierenkliniek 't Spoor

DIER & GEZONDHEID

Epilepsie bij de hond

Epilepsie komt niet alleen bij honden voor, maar ook bij katten. Maar omdat epilepsie bij beide diersoorten net iets anders verloopt, gaat dit artikel alleen over epilepsie bij de hond.

Wat is epilepsie? Epilepsie is een kortsluiting in de hersenen. Dat kan in heel de hersenen zijn (gegeneraliseerd) of alleen in een klein deel. Epilepsie kan ten gevolge van een ander probleem voorkomen (secundair), maar ook zonder oorzaak (primair).

Wat zijn de symptomen van epilepsie?

Als de epilepsie alleen in een klein deel van de hersenen voorkomt, zijn de symptomen afhankelijk van het gebied waar de epilepsie zit. Deze kunnen soms heel onopvallend zijn zoals alleen gedragsveranderingen, 'naar vliegen happen' of 'afwezig' zijn. Veel vaker voorkomend is de gegeneraliseerde epilepsie. Gegeneraliseerde epilepsie uit zich in drie fases. De voorfase kan enkele seconden, maar ook enkele dagen duren en is soms moeilijk te herkennen. Onrustig worden, aanhalig worden en verdwaasd zijn passen hierbij. De hoofdfase duurt enkele seconden of minuten. Uw hond heeft dan zelf niets door en kan omvallen, met het hele lichaam krampen, met de poten trappelen, klappertanden en schuimbekken, janken, gillen of piepen en ontlasting en urine laten lopen. Niet alle honden vertonen altijd alle signalen. U kunt geen contact met uw hond krijgen en hem dus ook niet kalmeren, het gaat vanzelf voorbij. Duurt de aanval langer dan tien minuten, dan moet u naar een dierenarts. De nafase kan enkele seconden tot dagen duren en uw hond gedraagt zich dan vreemd, is afwezig of heel moe.

Wat kunt u doen?

In eerste instantie kunt u tijdens een aanval vrij weinig. Zorg dat hij u of zichzelf niet verwondt, blijf rustig en maak een filmpje of aantekeningen om die later met de dierenarts te bekijken. Komt een aanval vaker dan eenmaal per maand of driemaal per 24 uur voor, duurt de hoofdfase langer dan tien minuten, herstelt uw hond na de aanval niet voldoende of is het de eerste keer dat hij een aanval heeft gekregen? Dan is het tijd om contact op te nemen met een dierenarts voor onderzoek en eventueel behandeling. Soms is een bezoek met spoed nodig en soms kan het gerust enige dagen wachten.





Definitief vetcellen verwijderen met Cryo-Therapie

Weg met die rol op je buik. Ga voor strakke billen, slanke bovenbenen en laat die onderkinnen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Met deze revolutionaire methode worden vetcellen bevroren waardoor ze definitief verdwijnen zodat je omvang vermindert en je huid verstevigt. Het resultaat is meestal direct zichtbaar en altijd blijvend. De behandeling is pijnloos.

Meer informatie op www.ingridblom.eu of bel **06-47307932**

**van €100
nu voor**

€75

Uniek kennismakingsaanbod

Maak gebruik van ons uniek kennismakingsaanbod.

* Alleen op afspraak



**ingrid
blom** PRAKTIJK
VOOR
HUIDVERZORGING

Wat is de oorzaak?

Epilepsie kan zonder oorzaak voorkomen: primaire epilepsie. Dit treedt op bij honden tussen de vijf maanden en de vijf jaar (maar jonger en ouder kan ook), en vooral bij een dertigtal rassen waarbij epilepsie erfelijk is.

Bij secundaire epilepsie is er wel een oorzaak aanwezig. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

- Orgaanfalen (lever/nieren)
- Tekorten (zuurstof/calcium/suiker)
- Vergiftiging (bijvoorbeeld letterlijk vergif, toxines of medicijnen)
- Ontstekingen (bijvoorbeeld hersenvliesontsteking, hondenziekte)
- Hersenbloeding/trombose
- Hersenafwijkingen (bijvoorbeeld trauma, litteken, waterhoofd)
- Tumoren

Voor de eerste vier oorzaken van secundaire epilepsie kunnen we een aanwijzing vinden in klinisch- en bloedonderzoek. Voor de laatste drie hebben we een onderzoek met MRI nodig.

Wat is de prognose?

Primaire epilepsie kan over het algemeen goed behandeld worden met medicatie. Omdat het nogal zware medicijnen zijn, wordt de dagelijkse medicatie vaak pas voorgeschreven als uw hond vaker dan een keer per maand een aanval heeft. Soms krijgt u al wel medicatie mee om tijdens een aanval te kunnen geven.

Bij secundaire epilepsie is de prognose afhankelijk van de oorzaak, maar over het algemeen een stuk slechter. Over het algemeen geldt: hoe heftiger de eerste uiting van epilepsie, hoe slechter de prognose.

dierenkliniek 't SPOOR
Oisterwijk



De lente begint!

Poezen kunnen
nu krols worden!

Wilt u geen kittens? Dan is
steriliseren heel verstandig!

**Sterilisatie poes:
€ 99,50**

Inlooppreekuren

- Maandag t/m vrijdag 9:00 uur tot 10:00 uur
en 18:00 uur tot 19:00 uur
- Woensdag (extra spreekuur) 13:30 tot 14:30 uur

Op afspraak

- Maandag t/m vrijdag 9:00 tot 19:30 uur
- Zaterdag 10:00 uur tot 12:00 uur

Boxtelsebaan 15, Oisterwijk

013 - 590 22 28

info@dierenkliniektspoor.nl

www.dierenkliniektspoor.nl

Volg dierenkliniektSpoor op 



HAPPY DOG
All you feed is love

**De wereld van HAPPY DOG
is de wereld
van gezonde voeding**

Verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren

**St. Willibrordstraat 6, 5056 HV Berkel-Enschot
013-533 16 89 www.hobbymix.nl**

Hobby-Mix
voor dieren 